

<u>DCI</u>	<u>DELAI</u>	<u>COND. CONSERV.</u>
AMSACRINE	5 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
ARSENIC TRIOXYDE Standard ou EC	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
AZACITIDINE EC	7 HEURES	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
BASILIXIMAB	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
BLEOMYCINE	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
BORTESOMIB EC	8 HEURES	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
BUSULFAN INJ. EC	10 HEURES	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CARBOPLATINE	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CARMUSTINE	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CHLORMETINE	1 HEURE	Administration extemporanée / Abri de la lumière
CIDOFOVIR	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CISPLATINE	2 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
CLADRIBINE Poche	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CLADRIBINE Cassette	7 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
CLOFARABINE EC	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CMA 676-GEMTUZUMAB- OZOGAMICIN	8 HEURES	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CYCLOPHOSPHAMIDE Standard ou EC	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CYTARABINE	8 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
CYTARABINE IT	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DACARBAZINE	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DACLIZUMAB	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DACTINOMYCINE	6 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DAUNORUBICINE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DEXRAZOXANE	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DOCETAXEL	3 HEURES	Administration extemporanée / Abri de la lumière
DOXORUBICINE	8 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DOXORUBICINE liposomiale	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
DOXORUBICINE myocet EC	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
EPIRUBICINE	8 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
ETOPOSIDE	2 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
ETOPOSIDE PHOSPHATE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
F 60008 Pierre Fabre EC	7 HEURES	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
FLUDARABINE Standard ou EC	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
FLURO URACILE	7 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
FOTEMUSTINE	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
GANCICLOVIR	5 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
GEMCITABINE	5 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
HOMOHARRINGTONINE	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
IDARUBICINE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
IFOSFAMIDE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
IRINOTECAN	4 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
L-ASPARAGINASE (Kidrolase°)	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
MELPHALAN	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
METHOTREXATE	8 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
METHOTREXATE IT	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
MITOGUAZONE seringue	2 HEURES	Administration extemporanée / Abri de la lumière
MITOGUAZONE verre	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière

7		L.GUICHERD		P. THOMARE		P. THOMARE	
6	10/04/2003	C.LEBAUDY		P. THOMARE		P. THOMARE	
1	17/06/1999	P. CHATEIGNER		A. DE MAISONNEUVE		P. THOMARE	
Rév	date	REDACTION	visa	VERIFICATION	visa	APPROBATION	visa

**HOTEL-
DIEU
UPCO**

**CONDITIONS DE STOCKAGE DES PRODUITS FINIS
PROD 02.18**

SEPT
2004

Rév.
7

**UF PHARMACIE CLINIQUE ONCOLOGIQUE
3937**

2

2

<u>DCI</u>	<u>DELAI</u>	<u>COND. CONSERV.</u>
MITOMYCINE	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
MITOXANTRONE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
m-THPC	2 HEURES	Température Ambiante / Abri de la lumière
OXALIPLATINE	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
PACLITAXEL	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
PEMETREXED	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
PENTOSTATINE	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
PS-341	8 HEURES	Température Ambiante / Abri de la lumière
RALTITREXED	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
RIBAVIRINE aérosol	2 JOURS	Température Ambiante / Abri de la lumière
RITUXIMAB EC	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
RITUXIMAB UPCO Standard	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
STREPTOZOCINE	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
THIOTEPA	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
TOPOTECAN	2 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
TROXACYTABINE EC	1 JOUR	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
VINBLASTINE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
VINCRISTINE	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
VINCRISTINE+DOXORUBICINE (VAD)	7 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
VINDESINE	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière
VINORELBINE	3 JOURS	+2 à +8 °C / Abri de la lumière