

Protocole				Version n°2 Du : 20/04/06		
NAVELBINE monochimiothérapie						
Médicaments à domicile		Dose (*)	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1 J8 J15	NAVELBINE	25 mg/m <sup>2</sup>	Site implantable	30 à 45 minutes	Poche souple	Na Cl 0,9% ⇒ 100ml
		(*) dose indicative <b>se conformer strictement à l'ordonnance</b>				
Intervalle J1-J28						
Surveillance biologique :						

### 1. MODALITES DE PRESCRIPTION

La première cure est prescrite par le médecin spécialiste, le J1 est effectué en HDJ.

Les cures suivantes sont prescrites en consultation par le médecin spécialiste et entièrement effectuées au domicile.

Les J8 et J15 sont réalisés au domicile du patient. Une consultation par le médecin généraliste est nécessaire la veille ou le jour même. Il possède la NFS du J7 ou du J14. Il évalue cliniquement la toxicité du traitement pour autoriser la procédure d'administration qu'il valide dans le cahier de liaison sur la fiche de reconduction de chimiothérapie

### 2. MODALITES D'ADMINISTRATION

**Traitement réalisé à domicile à J1, J8 et J15.**

NAVELBINE : 25 mg/m<sup>2</sup>/injection durant 30 à 45 minutes

Nombre de cures selon avis médical

#### Procédure du traitement

- Préparer la peau en regard du site implantable :
  - nettoyer la peau avec une solution moussante antiseptique : Bétadine Scrub ou Plurexid
  - rincer au sérum physiologique
  - sécher
  - appliquer l'antiseptique
- Mettre en place l'aiguille de Huber préalablement purgée
- Avant de préparer la chimiothérapie**, poser 250 ml de sérum physiologique à 0.9% en garde veine : vérification du retour veineux et de la perméabilité du site implantable, à arrêter dès le branchement de la perfusion de NAVELBINE
- Préparer la dilution de NAVELBINE à 25 mg/m<sup>2</sup> et injecter la dose indiquée dans 100 ml de sérum physiologique à 0.9%

5. Brancher la perfusion de NAVELBINE sur 30 à 45 minutes
6. A la fin de la perfusion de NAVELBINE, rincer la veine avec 100 ml de sérum physiologique à 0,9% en 15 minutes puis ôter l'aiguille de Huber en effectuant une pression positive avec 10 ml de sérum physiologique à 0,9%
7. Nettoyer la peau en regard du site implantable et appliquer un pansement sec et occlusif.

→ Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires du traitement.

### 3. EFFETS INDESIRABLES

- **Neutropénie** : NFS une fois par semaine (à adresser par le laboratoire à l'UCPO ou au médecin libéral) et la veille de toute consultation de reconduction de cure
- **Constipation**
- **Neuropathie périphérique**