

Protocole				Aredia		Version n°1 Du : 20/10/2003	
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume	
J1	Aredia	90 mg DT	Site implantable	2 heures	Poche souple	G5% 250 ml	
Intervalle J1-28 ou J1-J42							

1 - MODALITES DE PRESCRIPTION

Les cures sont prescrites en consultation par le médecin spécialiste et réalisées au domicile.

2 - MODALITES D'ADMINISTRATION

Nombre de cures selon avis médical

Procédure du traitement :

- 1 - Nettoyer la peau en regard du site implantable.
 - Nettoyage à la Bétadine Scrubb
 - Rinçage au sérum physiologique
 - Séchage
 - Application de Bétadine dermique
- 2 - Mettre en place l'aiguille de Huber.
- 3 - **Avant de préparer la chimiothérapie**, poser 250 ml de sérum physiologique en garde veine : vérification du retour veineux et de la perméabilité du site implantable, à arrêter dès le branchement de la perfusion d'Aredia
- 4 - Préparer la dilution d'Aredia à 90 mg DT et injecter la dose indiquée dans 250 cc de sérum physiologique à 0.9% : perfusion à passer en 2 heures.
- 5 - A la fin de la perfusion d'Aredia, rincer le site implantable avec 10 cc de sérum physiologique, effectuer une pression positive et ôter l'aiguille de Huber
- 6 - Nettoyer la peau en regard du site implantable et appliquer un pansement sec et occlusif à retirer 24h/48h plus tard

➔ **Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires au traitement**