

Protocole Carboplatine-5FU				Version n°2 Du : 06/05/2004		
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J2àJ6	5 FU	4000mg/m2	pompe	96 heures	cassette	G5% 250cc
Intervalle J1- J21 ou 28						

1 - MODALITES DE PRESCRIPTION

La prescription de chaque cure est réalisée en consultation par l'oncologue.

2 - MODALITES D'ADMINISTRATION

Le J1 de CARBOPLATINE est systématiquement effectué en hôpital de jour
J2 à J6 : le traitement par pompe de 5 FLUORO – URACILE sur 96 heures est effectué au domicile

Traitement réalisé tous les 21 ou 28 jours : 3 à 6 cures

Procédure du traitement :

1- Nettoyer la peau en regard du site implantable :

- avec de la Bétadine Scrub
- rincer au sérum physiologique
- sécher
- appliquer la Bétadine dermique (temps d'action 2mn)

2- Mettre en place l'aiguille de Huber préalablement purgée.

3 - Avant de préparer la chimiothérapie , poser 250 cc de sérum physiologique : vérification du retour veineux et de la perméabilité du site implantable , à arrêter dès le branchement de la pompe de 5 FLUORO-URACILE

4 - Préparer la dilution de 5 FLUORO-URACILE à 4000 milligrammes/m2 sur 96 heures . Ramener le volume initial à 250cc avec du sérum glucosé à 5% dans la pompe CADD-ONE, vitesse 62 ml/24 heures

5 - A la fin de la perfusion de 5 FLUORO-URACILE, rincer le site implantable avec 10cc de sérum physiologique, effectuer une pression positive et ôter l'aiguille de Huber .

6 - Nettoyer la peau en regard du site implantable et appliquer un pansement sec et occlusif à retirer 24h/48h plus tard

➔ **Surveillance de la perfusion continue sur 96 heures**

➔ **Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires au traitement**

3 - EFFETS INDESIRABLES

- Nausées – vomissements :
- Neutropénie :
- Thrombopénie :
- Mucite :
- Douleur thoracique :
- Diarrhée :