

Protocole					VAD		Version n°2 Du : 20/10/2003
Médicament		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Dilution	
J1àJ4	Oncovin	0,4 mg/j/ DT	IV KAT ou PAC	96 heures	Cassette	48 ml Nacl	
J1àJ4	Adriblastine	9mg/m2/j	IV KAT ou PAC	96 heures	Cassette	48 ml Nacl	
	Dexamethasone	40mg DT/j	Ampoule buvable				
Intervalle J1-J28							

MODALITES DE PRESCRIPTION

Les cures sont prescrites par le médecin spécialiste

La première cure est réalisée entièrement au sein de l'établissement

Le J1 des cures suivantes est systématiquement réalisé en HDJ, J2à J4 au domicile du patient.

2 - MODALITES D'ADMINISTRATION

J1 en HDJ : pose de la pompe

- **Oncovin** : 0,4 mg dose totale/jour sur 96 heures

- **Adriamycine** : 9mg/m2/jour sur 96 heures

Cycle de 28 Jours (J 1= J 28)

J2 à J4 au domicile du patient

- **Surveillance et débranchement de la pompe**

- **Dexaméthasone** : 40 mg dose totale (délivrance officine) par jour de J9 à J12 et de J17 à J21 pendant les deux premiers cycles

Prophylaxie :

- **Bactrim Fort** : 1cp lundi-mercredi-vendredi durant tous les cycles

- **Triflucan** : optionnel selon le prescripteur, 100 mg/j, tous les jours, tous les cycles

Procédure du traitement :

A la fin des 96 heures , à domicile :

- rincer le site implantable avec 10 ml de sérum physiologique , et faire une pression positive

- ôter l'aiguille de Huber

- nettoyer la peau en regard du site

- appliquer un pansement sec occlusif

➔ **Surveillance quotidienne de la perfusion continue à domicile sur 96 heures**

➔ **Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires au traitement**

3 - EFFETS INDESIRABLES

Ce sont ceux de la corticothérapie :

- **Syndrome infectieux**
- **Diabète**