

Protocole		Taxol hebdomadaire			Version n°1 Du : 20/04/06	
Médicament		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Dilution
J1 J8 J15	Taxol	80mg/m ²	pompe	1 heure	ne pas utiliser de matériel contenant du PVC	G5% 250 ml
	Solumedrol	120 mg	IVD			
	Polaramine 5 mg	5 mg	IVD			
	Azantac	50 mg	IVD	2 minutes		NaCl 20 ml
J1-J28						
Surveillance biologique : NFS + Plaquettes avant chaque injection						

1. MODALITES DE PRESCRIPTION

Le premier cycle est prescrit par le médecin spécialiste et totalement effectué en HDJ (J1, J8 et J15).

Les cycles suivants sont prescrits en consultation par le médecin spécialiste et entièrement effectués au domicile.

Les J1, J8 et J15 sont réalisés au domicile du patient. Une consultation par le médecin généraliste est nécessaire la veille ou le jour même. Il possède la NFS du J7 ou du J14. Il évalue cliniquement la toxicité du traitement pour autoriser la procédure d'administration qu'il valide dans le cahier de liaison sur la fiche de reconduction de chimiothérapie

Nota : en cas d'utilisation d'un casque réfrigérant (sur prescription médicale) le traitement sera administré en hôpital de jour.

2. MODALITES D'ADMINISTRATION

Traitement réalisé à domicile à J1, J8 et J15.

TAXOL : 80 mg/m²/injection durant 1 heure.

Prémédication à effectuer 30 minutes avant la perfusion de TAXOL

Solumédrol : 80 mg

Polaramine : 5 mg

Azantac 50 mg

Mettre les 3 produits dans 100 ml de G5% à passer sur 15 minutes

Ne pas utiliser de matériel contenant du PVC pour le passage du TAXOL

Nombre de cures selon avis médical

Procédure du traitement

1. Préparer la peau en regard du site implantable :
 - nettoyer la peau avec une solution moussante antiseptique : Bétadine Scrub ou Plurexid
 - rincer au sérum physiologique
 - sécher
 - appliquer l'antiseptique :
2. Mettre en place l'aiguille de Huber préalablement purgée
3. **Avant de préparer la chimiothérapie**, poser 250 ml de sérum physiologique à 0.9% en garde veine : vérification du retour veineux et de la perméabilité du site implantable, à arrêter dès le branchement de la perfusion de TAXOL
4. Effectuer la prémédication 30 minutes avant la pose de la perfusion de TAXOL
5. Préparer la dilution de TAXOL à 80 mg/m² et injecter la dose indiquée dans 250 ml de sérum glucosé à 5% en poche Freeflex (sans PVC)
6. Brancher la perfusion de TAXOL sur 1 heure
7. A la fin de la perfusion de TAXOL, rincer le site implantable avec 100 ml de sérum physiologique à 0,9% en 15 minutes puis ôter l'aiguille de Huber en effectuant une pression positive avec 10 ml de sérum physiologique à 0,9%
8. Nettoyer la peau en regard du site implantable et appliquer un pansement sec et occlusif à retirer 24h/48h plus tard

→ **Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires du traitement.**

3. EFFETS INDESIRABLES

- a. **Hypersensibilité immédiate**
- b. **Toxicité neurologique** : neuropathies périphériques, paresthésie
- c. **Alopécie**
- d. **Douleurs musculaires**
- e. **Neutropénie**