

Protocole TAXOTERE - GEMZAR				Version n°1 Du : 20/04/06		
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J8	GEMZAR	900 mg/ m ²	Site implantable	30 à 45 minutes	Poche souple	Na Cl 0,9% ⇔ 250ml
Intervalle J1-J21						
Surveillance biologique : NFS la veille de chaque injection						

1. MODALITES DE PRESCRIPTION

Le patient reçoit le 1^{er} cycle en HDJ (soit J1 et J8)

Les cures sont prescrites en consultation par le médecin spécialiste lors du J8 qui est effectué en HDJ.

Le J8 est réalisé au domicile du patient. Une consultation par le médecin généraliste est nécessaire la veille ou le jour même. Il possède la NFS du J-1. Il évalue cliniquement la toxicité du traitement pour autoriser la procédure d'administration qu'il valide dans le cahier de liaison sur la fiche de reconduction de chimiothérapie.

2. MODALITES D'ADMINISTRATION

J1 : TAXOTERE + GEMZAR en HDJ

J8 : Traitement réalisé à domicile

GEMZAR : 900 mg/m²/injection durant 30 à 45 minutes

Nombre de cures selon avis médical

Procédure du traitement

- Préparer la peau en regard du site implantable :
 - nettoyer la peau avec une solution moussante antiseptique : Bétadine Scrub ou Plurexid
 - rincer au sérum physiologique
 - sécher
 - appliquer l'antiseptique
- Mettre en place l'aiguille de Huber préalablement purgée
- Avant de préparer la chimiothérapie**, poser 250 ml de sérum physiologique à 0.9% en garde veine : vérification du retour veineux et de la perméabilité du site implantable, à arrêter dès le branchement de la perfusion de GEMZAR
- Préparer la dilution de GEMZAR à 900 mg/m² et injecter la dose indiquée dans 250 ml de sérum physiologique à 0.9%
- Brancher la perfusion de GEMZAR sur 30 minutes à 45 minutes

6. A la fin de la perfusion de GEMZAR, rincer la veine avec 20 ml du sérum physiologique à 0,9% du garde veine puis ôter l'aiguille de Huber en effectuant une pression positive avec 10 ml de sérum physiologique à 0,9%
7. Nettoyer la peau en regard du site implantable et appliquer un pansement sec et occlusif à retirer 24h/48h plus tard

→ Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires du traitement.

3. EFFETS INDESIRABLES

- Nausées – vomissements
- Neutropénie et thrombopénie : NFS la veille de chaque injection
- E.G. : douleurs, syndrome grippal