

ONCO – Pays de la Loire	SOINS A DOMICILE	PROTOCOLES
-------------------------	------------------	------------

Protocole				ZOMETA		Version n° Du :	
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume	
J1	ZOMETA 4 mg	4 mg (dose totale)	Voie périphérique	15 minutes		G 5% ⇔ 100 ml	
Intervalle J1-J28 ou J1-J21							
Surveillance biologique :							

1. MODALITES DE PRESCRIPTION

Les cures sont prescrites en consultation par le médecin spécialiste (pour 2 à 3 cycles), et réalisées au domicile.

2. MODALITES D'ADMINISTRATION

Traitement réalisé à domicile tous les 28 jours (ou 21 jours)

ZOMETA : 4 mg/injection durant 15 minutes

Nombre de cures selon avis médical

Procédure du traitement

1. Préparer la peau en regard du site implantable :
 - nettoyer la peau avec une solution moussante antiseptique : Bétadine Scrub ou Plurexid
 - rincer au sérum physiologique
 - sécher
 - appliquer l'antiseptique : Bétadine dermique ou Chlorhexidine alcoolique à 0,5% (temps d'action 2 minutes)
2. Avant de préparer l'injection de ZOMETA, poser 250 ml de sérum physiologique à 0.9% en garde veine : vérification du retour veineux et de la perméabilité de la veine ou du site, à garder jusqu'au branchement de la perfusion de ZOMETA
3. Préparer la dilution de ZOMETA et injecter la dose indiquée dans 100 ml de sérum Glucosé à 5%
4. Brancher la perfusion de ZOMETA sur 15 minutes
5. A la fin de la perfusion, rincer la veine avec quelques ml du sérum physiologique à 0,9% du garde veine

→ Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires du traitement.

→ Durée totale de l'acte inférieure à 1 heure par 24 heures.

3. EFFETS INDESIRABLES

Frissons, fièvre, recrudescence des douleurs.